

PLANO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO
PARA CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS

Identificação do município:

a) Região de saúde: R11

b) Coordenadoria de saúde: 12º

Contato: lourivaldinofurtadoslg@gmail.com

SÃO LUIZ GONZAGA, JANEIRO 2022

Objetivo:

Definir as ações para vacinar as crianças de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias servindo como apoio as unidades de saúde que aplicarão o imunizante.

Público alvo:

Crianças de 6-11 anos. Sendo 2713 crianças cadastradas nesta faixa etária

Número de vacinadoras no município: 19

Número de salas de vacinas: 09

Especificações técnicas da vacina Comirnaty de uso pediátrico produzida pelo laboratório Pfizer/Biontech

A vacina autorizada para uso em crianças de 05 a 11 anos de idade é a Comirnatypediátrica, produzida pelo laboratório Pfizer/Biontech. Possui o frasco com a tampa na cor laranja, que difere do frasco de tampa na cor roxa utilizada para 12 anos de idade ou mais.

Vacina Comirnaty™ de uso pediátrico - Pfizer/Biontech

Plataforma RNA mensageiro (mRNA)

Forma Farmacêutica Suspensão injetável que requer diluição

Apresentação Frasco-ampola; 10 doses/frasco; 10mcg/dose

Via de administração IM (intramuscular)

Esquema vacinal/Intervalo preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações:

02 doses de 0,2 ml, com intervalo de 8 semanas (recomendação do MS)

Prazo de validade e conservação do frasco fechado:

Em congelamento (faixa - 90 °C A – 60oC): 6 meses

Em congelamento (-25oC a -15oC): NÃO ARMAZENAR

Em resfriamento (2o a 8o): 10 semanas (70 dias)

Prazo de validade/temperatura de conservação após diluição - 12 horas (2° a 25oC)

Descartar 12 horas após a diluição

Contraindicações Não deve ser administrada a indivíduos com hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um dos excipientes da vacina

Fonte: Pfizer/Biontech - Bula para profissionais da saúde, 2021 (Plano estadual de vacinação para crianças)

Estratégia de vacinação:

- a) Capacitação dos vacinadores para aplicação das vacinas.
- b) As vacinas serão oferecidas nas salas de vacina, (nas quais são administradas outras vacinas do calendário), porém

destinados horários exclusivos para vacinação de crianças contra a COVID-19, adotando todas as medidas para evitar erros de vacinação;

- c) A vacina Covid-19 não será administrada de forma concomitante a outras vacinas do calendário infantil, por precaução, sendo recomendado um intervalo de 15 dias entre estas;
- d) Se organizará um ambiente onde as crianças sejam acolhidas e permaneçam no local em que a vacinação ocorrer por pelo menos 20 minutos após a aplicação, facilitando que sejam observadas quaisquer eventos que possam ocorrer durante esse breve período;
- e) Os profissionais de saúde farão orientações pertinentes aos pais/responsáveis previamente à administração do imunobiológico. É importante que os profissionais de saúde, antes de aplicarem a vacina, informem ao responsável que acompanha a criança sobre os principais sintomas locais esperados (por exemplo, dor, inchaço, vermelhidão no local da injeção) e sistêmico (por exemplo, febre, fadiga, dor de cabeça, calafrios, mialgia, artralgia) outras reações após vacinação, como linfadenopatia axilar localizada no mesmo lado do braço vacinado foi observada após vacinação com vacinas de mRNA COVID-19.
- f) Os pais ou responsáveis sejam orientados a procurar o médico se a criança apresentar dores repentinas no peito, falta de ar ou palpitações após a aplicação da vacina.
- g) Os profissionais de saúde, antes de aplicarem a vacina, mostrem ao responsável que acompanha a criança que se trata da vacina contra a COVID-19, frasco na cor laranja, cuja dose de 0,2ml, contendo 10 mcg da vacina contra a COVID-19, Comirnaty (Pfizer/Wyeth), específica para crianças entre 5 a 11 anos, bem como seja mostrado a seringa a ser utilizada (1 mL) e o volume a ser aplicado (0,2mL)

- h) As crianças que completarem 12 anos entre a primeira e a segunda dose, permaneçam com a dose pediátrica da vacina Comirnaty;
- i) Os profissionais da saúde deverão estar atentos e treinados para atender e captar eventuais reações adversas em crianças de 5 a 11 anos, após tomarem e registrar nos eventos adversos a vacina bem como monitorar a criança
- j) Os pais ou responsáveis deverão ser lembrados que não sabemos ainda quanto tempo dura a proteção da vacina contra a COVID-19. Por isso, continua sendo recomendado seguir as medidas não farmacológicas de prevenção contra a COVID-19 estabelecidas pelas autoridades de saúde pública como distanciamento social, lavagem e higienização das mãos, bem como o uso de máscaras. Adotar estas medidas no ambiente onde as crianças serão acolhidas.
- k) A vacinação ocorrerá em horário habitual de funcionamento da sala de vacina, em turno exclusivo para esta ação.
- l) O vacinador fará o registro imediato na Caderneta de Saúde da Criança, porém nos sistemas de informação (SIPNI) o registro será feito posteriormente.
- m) Orientar os agentes de saúde para visitar os pais de crianças nesta faixa etária levando informações sobre, horários e documentação exigida para a vacinação. Também fixar cartazes na Unidade de saúde com estas informações.
- n) Dia 19/01 as vacinas iniciarão com as crianças portadoras de comorbidades, sendo estas: doenças neurológicas crônicas, diabetes melitus, obesidade grave (acima do percentil 97), asma grave ou outras pneumopatias crônicas graves, imunodeprimidos, neoplasias, doença hematológica, síndrome de down, doença renal crônica, doença hepática e doença cardiovascular.

COMUNICAÇÃO:

Assim como em todas as etapas da campanha de vacinação contra a COVID-19, é imprescindível manter a população informada sobre os locais, horários e documentação exigida para a vacinação, bem como informações sobre o imunobiológico, benefícios, reações adversas comuns e orientações na ocorrência de eventos adversos graves.

O município utilizará o site da prefeitura como meio oficial para divulgação das vacinações.

Também ocorrerá a divulgação em meios de comunicação diversos, tais como rádio, jornal, redes sociais, entre outros.