

<b>VACINA</b>	<b>EFICÁCIA GERAL</b>	<b>SEGURANÇA</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>
PFIZER/BIONTEC	95%	Reações comuns: Dor no local de injeção (>80%), fadiga (>60%), cefaleias (>50%), mialgia (>40%), calafrios (>30%), artralgia (>20%), pirexia e inchaço no local de injeção (>10%) e geralmente foram de intensidade leve ou moderada e resolveram-se alguns dias após a vacinação.	Redução de 92% dos casos de Covid-19 geral, 94% de redução em COVID-19 sintomáticos, Redução de 87% na Hospitalização e 92% de redução em COVID-19 severa/UTI (Dados epidemiológicos de Israel)
Oxford/Astrazeneca/Fiocruz	70,42%	Reações mais comuns: (>10%) apresentaram Sensibilidade, dor, sensação de calor, vermelhidão, coceira, inchaço ou hematoma (manchas roxas) onde a injeção é administrada Sensação de indisposição de forma geral Sensação de cansaço (fadiga) Calafrio ou sensação febril Dor de cabeça Enjoos (náusea) Dor nas articulação ou dor muscular	100% de proteção contra casos graves (Dados da fabricante)
Coronavac	50,40%	Reações mais comuns: (>10%) dor no local da aplicação; (<10%) enjoos, diarreia, dor de	Redução de 80% em COVID-19 sintomática, 86% de redução em hospitalização e

		cabeça, cansaço, dor muscular, tosse, dor nas articulações, coceira, coriza, dor ao engolir, congestão nasal (<1%) vômito, calafrios, diminuição de apetite, reação alérgica, tontura, hematoma, hipotermia, desconforto nos membros, fraqueza muscular	95% de redução em óbitos causado por COVID-19 (Dados do fabricante, através do estudo epidemiológico em Serrana)
Jansen	66,90%	Reações mais comuns: Dor no local da injeção (48,6%); Cefaléia (38,9%); Fadiga (38,2%); Mialgia (33,2%), náusea (14,2%) e febre (9%)	Redução em 84,5% nos casos graves de COVID-19 (Dados do fabricante)